

# А ваш ребенок готов

## Закон штата Миннесота об иммунизации

### Требования в отношении иммунизации

С помощью данной таблицы определите, какие прививки необходимы ребенку для посещения детского дошкольного учреждения, программы раннего развития и школы (государственной и частной).  
Найдите возраст ребенка или класс, в котором он учится, и проверьте, получил ли он то количество прививок, которое указано галочками под каждой вакциной. Дети от рождения до 2 лет, возможно, еще не прошли полную вакцинацию. В таблице на обратной стороне указано, в каком возрасте и какими прививками следует прививать ребенка.

От рождения до 4 лет Программы раннего развития и детские дошкольные учреждения	Возраст: от 5 до 6 лет <sup>①</sup> Детский сад	Возраст: от 7 до 11 лет С 1-го по 6-й класс	Возраст: 11-12 лет С 7-го по 12-й класс
Гепатит А ✓✓			
Гепатит В ✓✓✓	Гепатит В ✓✓✓	Гепатит В ✓✓✓	Гепатит В ✓✓✓ <sup>⑥</sup>
DTaP/DT ✓✓✓✓	DTaP <sup>④</sup> ✓✓✓✓✓	✓✓✓ столбняк и дифтерия	Tdap <sup>⑦</sup> ✓
Полиомиелит ✓✓✓	Полиомиелит <sup>⑤</sup> ✓✓✓✓	Полиомиелит ✓✓✓	Полиомиелит ✓✓✓
MMR ✓	MMR ✓✓	MMR ✓✓	MMR ✓✓
Hib ✓			Менингококковая <sup>⑧</sup> ✓ и ревакцинирующая доза
Пневмококковая <sup>②</sup> ✓✓✓✓			
Ветряная оспа <sup>③</sup> ✓	Ветряная оспа <sup>③</sup> ✓✓	Ветряная оспа <sup>③</sup> ✓✓	Ветряная оспа ✓✓

### Виды вакцинации, рекомендуемые, но не являющиеся обязательными:

Против гриппа ежегодно всем детям с 6 месяцев	
Против ротавирусной инфекции младенцам	Против вируса папилломы человека (ВПЧ) в 11–12 лет

- ① Детям младшего школьного возраста (до 6 лет) рекомендуется следовать графику прививок против полиомиелита и DTaP/DT для детского сада.
- ② Необязательно детям старше 24 месяцев.
- ③ Ребенку, переболевшему ветрянкой, прививка не требуется. Если ребенок переболел после 2010 г., врач ребенка должен подписать форму.
- ④ Если четвертая прививка DTaP сделана после 4 лет, пятую прививку делать не нужно. Последнюю дозу вакцины DTaP следует вводить не раньше 4-летнего возраста.
- ⑤ Если третья доза вакцины против полиомиелита введена после 4 лет, четвертую прививку делать не нужно. Последнюю дозу вакцины против полиомиелита следует вводить не раньше 4-летнего возраста.
- ⑥ Также возможна 2-этапная схема вакцинации против гепатита В для детей от 11 до 15 лет.
- ⑦ Требуется справка о введении не менее трех доз вакцины против дифтерии и столбняка. Если ребенок привит вакциной Tdap в возрасте 7–10 лет, ревакцинация Tdap не нужна. Td не соответствует требованиям Tdap.
- ⑧ Требуется одна доза, начиная с 7-го класса. Ревакцинирующая доза обычно назначается в 16 лет, но время проведения вакцинации зависит от даты введения первой дозы.

### Освобождение


Для посещения детского дошкольного учреждения, программы раннего развития и школы в штате Миннесота необходимо предъявить справку о вакцинации ребенка либо официальное освобождение.  
Родители могут подать либо медицинское освобождение, подписанное поставщиком медицинских услуг, либо оформить отказ от вакцинации — он должен быть подписан родителем/опекуном и нотариально заверен.

### Нужны данные?

Для получения копии прививочной карты ребенка обратитесь к своему врачу или позвоните в Информационную систему штата Миннесота по иммунизации (Minnesota Immunization Information Connection, MIIC) по телефонам 651-201-5503 или 1-800-657-3970.

# График прививок: от рождения до 16 лет

ДДУ = детское дошкольное учреждение  
 ПРР = программа раннего развития  
 К-12 = с детского сада по 12-й класс  
 7-12 = с 7-го по 12-й класс



**Обязательно:**

Нер В: ДДУ, ПРР, К-12

DTaP/Tdap: ДДУ, ПРР, К-12

Hib: ДДУ и ПРР  
 MSV: 7-12

PCV: ДДУ и ПРР

IPV: ДДУ, ПРР, К-12

MMR: ДДУ, ПРР, К-12

Ветряная оспа: ДДУ, ПРР, К-12

Нер А: ДДУ и ПРР

**Грипп** (каждый год осенью)

**БЕСКОИТЕСЬ О СТОИМОСТИ.**  
 Вы можете пройти вакцинацию бесплатно или за небольшую плату. Обратитесь к своему врачу или в больницу.

Еще не поздно! Если вы все еще не привили ребенка, обратитесь к своему врачу или в больницу для проведения вакцинации.

Согласно закону штата Миннесота, для посещения детского дошкольного учреждения, программы раннего развития и школы ребенку необходима справка о проведенной вакцинации. Однако если у ребенка имеются медицинские противопоказания либо родители сознательно отказываются от вакцинации, необходимо оформить официальное освобождение (например, от пневмококковой или менингококковой инфекции). Обратитесь к своему врачу или в больницу.

Защитите себя и своего будущего ребенка от коклюша. Сделайте прививку Tdap между 27-й и 36-й неделями беременности. Проконсультируйтесь с врачом.

\*Количество зависит от применяемого препарата.  
 Для получения копии обратитесь к своему врачу или позвоните в Информационную систему штата Миннесота по иммунизации (Minnesota Immunization Information Connection, MIIC) по телефонам 651-201-5503 или 1-800-657-3970.

Условные обозначения

DTaP/Tdap = дифтерия, коклюш, столбняк	Hib = гемофильная инфекция, тип b
Нер В = гепатит В	IPV = полиомиелит
MMR = корь, свинка, краснуха	MSV = менингококковая инфекция
	RV = ротавирусная инфекция